

Insetticidi registrati su *Popillia japonica* (azione sugli adulti)

NOME	Sostanza attiva	Uso consentito su	N° trattamenti/dose
DECIS EVO	Deltametrina	Erba medica, trifoglio, graminacee foraggere, floreali, vivai e ornamentali in pieno campo, pioppo e forestali in vivaio , campi da golf e tappeti erbosi	Da etichetta (non autorizzato in serra per <i>Popillia</i>)
CONFIDOR 200SL	Imidacloprid	Floreali e ornamentali da fiore e non da fiore (in serra)	Da etichetta: al massimo un trattamento l'anno Nota: molto tossico per le api

Insetticidi utilizzabili contro altri insetti ma con azione collaterale sugli adulti di *Popillia japonica*

ATTENZIONE: verificare sempre che l'insetticida che si vuole impiegare sia autorizzato sulla coltura o sulla tipologia di coltivazione (serra, vivaio, pieno campo ecc.) che si vuole trattare.

L'indicazione sull'efficacia contro *P. japonica* deriva da dati americani* e/o da osservazioni preliminari** sull'uso di queste sostanze attive nelle nostre aree infestate. Consultare le indicazioni in etichetta per scegliere il formulato autorizzato sulla coltura da trattare.

GRUPPO	Sostanze attive	Azione	Efficacia
PIRETROIDI	Lambda-cialotrina Acrinatrina, Alfa-cipermetrina, Cipermetrina, Zetacipermetrina, Esfenvalerate, Tau-fluvalinate, Bifentrin Ciflutrin, Beta-Ciflutrin	Principale per contatto	In genere i piretroidi presentano una buona efficacia
FOSFORGANICI	Corpirifos etile	Contatto e ingestione	Da verificare
DIAMMIDI	Chlorantraniliprole (richiesta uso eccezionale per i tappeti erbosi, in corso di valutazione)	Contatto e ingestione	Moderata / Buona
NEONICOTINOIDI	Acetamiprid**	Ingestione e contatto	Moderata / Buona
Consentiti in Agricoltura Biologica			
-	Azadiractina – NEEM *	Repellente (max 2-3 giorni)	scarsa
-	Piretrine naturali	Contatto	Scarsa
-	Piretrine + Piperonil butossido	Contatto	Discreta
-	Spinosad	Contatto	Scarsa/Moderata
NO prodotto fitosanitario ma Presidio Medico-Chirurgico	Permetrina +tetrametrina + piperonil butossido	Principale per contatto	Buona